

ENROVET 30 PLUS

Descripción

El Enrovet 30 plus es una solución oral antibiótica bactericida a base de enrofloxacin. 30% más de bromhexina (broncodilatador).

Indicaciones de uso

Esta indicado para el tratamiento y control de enfermedades infecciosas respiratorias y digestivas de las aves, tales como micoplasmosis, salmonelosis, colibacilosis, coriza infecciosa, colera aviar, erisipelas. Se utiliza en pollos parrilleros, pollas de reposición y aves reproductoras.

Vía de aplicación

Administración oral incorporando al agua de bebida.

Dosificación

| Especie y categoría | Dosis de enrofloxacin (mg/kg de PV) | Dosis de Enrovet 30 Plus (ml/kg de PV) | Duración del tratamiento |
|---------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| Aves | 10 | 0.003 ml | 3 a 5 días |

La dosificación debe ajustarse en caso de variar el consumo de agua.

La duración del tratamiento dependerá del caso y del criterio del profesional actuante.

1. Calcular la cantidad de producto necesaria para el total de kg de aves a tratar (0.033 ml/kg p.v)
2. Calcular la cantidad de agua consumida diariamente por las aves a tratar.
3. Diluir todo el volumen del medicamento en $\frac{1}{4}$ del volumen de agua de bebida consumida diariamente por el lote
4. Esperar a que los animales consuman el total de agua medicada
5. Durante el resto del día consumo de agua no medicada.

Contraindicaciones

No administrar en a animales que presenten insuficiencia hepática o renal.

No administrar en casos de hipersensibilidad conocida al principio activo.

No administrar junto con tetraciclinas, cloranfenicol, macrólidos y lincosaminas.

Precauciones y advertencias

Una vez incorporado al agua de bebida, mezclar para asegurar la homogénea distribución del producto.

Se recomienda el uso de guantes, ropa de protección, máscaras y anteojos al manipular o mezclar el producto, evitando el contacto con la piel, ojos o inhalación. En caso de que ocurra el contacto con piel y ojos, lavar con abundante agua.

No comer ni fumar durante la manipulación del producto.



Las personas con hipersensibilidad conocida no deben manipular este producto. En caso de vertido accidental, recoger los líquidos empapando con material absorbente y eliminarlos como desperdicios en contenedores apropiados. Manipular en lugares ventilados. Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente. El uso de este producto sin un diagnóstico correcto puede generar resistencia antimicrobiana, se deberá respetar la dosis, intervalos y duración del tratamiento.

Restricciones de uso

El periodo de retiro previo al sacrificio para consumo humano es de 7 días para las aves. No administrar a otras especies animales para los que no esté indicado el producto.

Almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco, seco, ventilado, que no supere los 25°C y a resguardo de la luz solar directa. No congelar. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Contenido neto: 1 litro.