

# ENSOL – MAD 1% PX

(Anticoccidianos / Coccidicidas)

<b>Activo</b>	<b>Concentración</b>
Maduramicina	1 gr
Excipiente csp	100 gr

## **Indicaciones de uso:**

Prevención y control de la coccidiosis de las aves. Indicado para pollos de engorde, reproductores, pollas de reposición, pavos, codornices y faisanes.

## **Espectro de acción:**

Es activo contra los coccidios patógenos del género *Eimeria* spp., tales como *Eimeria tenella*, *Eimeria necatrix*, *Eimeria brunetti*, *Eimeria acervulina*, *Eimeria maxima*, *Eimeria mitis*, *Eimeria mivati*, *Eimeria meleagridis*, *Eimeria meleagritidis*, *Eimeria dispersa*, *Eimeria gallopavonis*, *Eimeria adenoeides*, causantes de severos perjuicios económicos.

## **Características y modo de acción:**

El principio activo es una molécula ionófora, es decir, forma complejos con los iones, fundamentalmente sodio y potasio. Su mecanismo de acción se basa en esta propiedad, afectando el transporte de iones a través de la membrana del parásito que provoca un desbalance iónico y agota las reservas energéticas; y consecuentemente la muerte del mismo. Actúa durante las primeras fases de vida de los coccidios (esporozoíto a trofozoíto y sobre la primera generación de esquizontes).

## **Administración:**

ENSOLMAD 1% se administra vía oral. Puede ser utilizado como un ingrediente en la preparación de núcleos, correctores dietarios, premezclas, suplementos alimenticios o alimentos completos. Una vez dosificado debe mezclarse adecuadamente para garantizar la homogeneidad de la preparación. Pollos de engorde: Administración continua hasta el periodo de retiro pre-faena.

Pollas de reposición: Continua desde el primer día de vida hasta las 16 semanas de edad.

# ENSOL – MAD 1% PX

(Anticoccidianos / Coccidicidas)

## **Dosificación:**

500 g de ENSOLMAD 1% por Tonelada de alimento final.

Consultar con el veterinario, para ajustar la dosificación de acuerdo a las necesidades del caso a tratar.

## **Precauciones, advertencias, restricciones, contraindicaciones:**

No administrar a gallinas ponedoras en postura, conejos, equinos, bovinos y ovinos. No asociar con Tiamulina u Oleandomicina. No utilizar para el tratamiento de brotes de coccidiosis. No exceder la dosis recomendada, ya que el principio activo posee un estrecho margen de seguridad.

## **Período de retiro:**

Respetando las indicaciones de uso, requiere un período de retiro pre-faena mínimo de 5 (cinco) días.

**Presentación:** Bolsas de 25kg

**Vida útil:** En envase original cerrado se conserva por 2 años

Inscrip. SENASA: N° 09 - 188